

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-6-68 7.65

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

Les abonnés sont avisés que le 5 juin 1968 le texte suivant a été remis à la presse quotidienne :

- Supplément n° 2 au Bulletin n° 92 -

5 juin 1968

LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES "MIDI-PYRENEES" COMMUNIQUE : Le 5 juin :

VIGNE

- Mildiou et Black-rot de la vigne : Des taches sont apparues dans le Tarn depuis plusieurs jours déjà. Des foyers doivent également exister dans d'autres vignobles de la Circonscription.

Appliquer sans attendre un nouveau traitement général.

- Oïdium : Ajouter un anti-oïdium à la bouillie destinée à lutter contre le Mildiou et le Black-rot.
- Vers de la grappe : Les éclosions de chenilles se poursuivent. Effectuer un traitement dans toutes les vignes habituellement sensibles.

ARBRES FRUITIERS

- Tavelures du poirier et du pommier : La lutte peut être interrompue dans les vergers actuellement indemnes de taches alors qu'elle doit être poursuivie dans les plantations moins bien protégées.
- Oïdium du pommier : Continuer à supprimer systématiquement les pousses oïdiées et ajouter un anti-oïdium au traitement dirigé contre les tavelures.
- Carpocapse ou ver des pommes et des poires : Les premières pénétrations, d'importance notable, vont se produire très probablement vers les 10 - 12 juin. En conséquence, intervenir à partir de ce moment là.
- Carpocapse et rouille du prunier : Renouveler le traitement déjà conseillé en employant du zinèbe, du zirame ou du manèbe auquel on ajoutera l'un des esters phosphoriques homologués contre la Tordeuse orientale du pêcher.

CULTURES LEGUMIERES

- Mildiou de la pomme de terre : Dans les cultures bien développées (couvrant le sol ou près de ce stade) appliquer sans attendre un fongicide homologué contre ce champignon. Lorsque des larves de doryphore sont constatées, ajouter un insecticide.

P.153

- Oïdium sur melon : Dans les cultures sous tunnel, commencer la protection.
-

Un résumé de ce texte a été remis à Radio "Midi-Pyrénées" le 4 juin.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

L. IMBERT